



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®



POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 19 du 20 août 2002 - 01 page

Phénologie

Stade : Grossissement des tubercules.
Le défanage se poursuit sur les variétés de consommation.

Mildiou

Le coin des modèles

Sur les postes de St Just, Vic sur Aisne, Verdilly et Villiers le sec, aucune contamination n'a été enregistrée la semaine passée. On n'attend pas de nouvelle sortie de taches cette semaine. Mais les orages actuels peuvent réactiver les cycles.

Sur l'ensemble des autres postes, même si le nombre des cycles en cours a diminué du fait des chaleurs de la semaine dernière, les risques restent présents. Depuis ce week-end, les derniers orages entretiennent la pression de maladie.

Prévisions climatiques

Selon Météo France, le temps restera pluvieux jusqu'à jeudi, date à laquelle on peut espérer le retour d'éclaircies.

Appui à l'interprétation du modèle

Sur les secteurs où le potentiel de sporulation reste élevé, il n'est pas envisageable de décaler le renouvellement du traitement.

Près des postes à risque faible ou nul (Vic, Villiers..) vous pouvez attendre la fin de la semaine (23, 24).

Préconisations pour les parcelles que l'on veut maintenir en végétation

TOUTES VARIETES

► **Poursuivez un renouvellement à 7 jours avec un dithiocarbamate à 1600 g de m.a., ou choisissez une spécialité ayant une meilleure tenue au lessivage.**

Pour les parcelles ayant subi le lessivage des produits de contact:

si le renouvellement est retardé de 12 à 48h, appliquez un produit proposant une action curative à base de cymoxanil (Remiltine, Nautille, Sarman...)

si le renouvellement est retardé de 2 à 3 jours, choisissez un fongicide systémique à base de cymoxanil et d'oxadixyl (Pulsan..).

Préconisations pour les parcelles où la date de défanage est proche

TOUTES VARIETES

► **Dans le cas où des symptômes de mildiou ont été observés, préférez l'emploi des produits type fluazinam (SHIRLAN) ou cyazofamide (RANMAN). Ces produits résistent mieux au lessivage et permettent de minimiser les attaques de mildiou sur tubercules. Un renouvellement à 7 jours est conseillé.**

► **Dans le cas contraire, maintenez une protection avec un mancozèbe, et voir plus haut en cas de lessivage.**

► **Pour les parcelles où le défanage est en cours, maintenez une protection fongicide jusqu'à dessiccation totale des fanes.**

Mildiou

Les pluies orageuses entretiennent les risques.

Situation épidémiologique poste par poste
(d'après Guntz-Divoux)

Postes climatiques	Génération	Date der. Contaminations	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens (Boves)	10ème	aucune	aucune	fort
Attilly	12ème	13/08	19/8	moyen
Ebouleau	12ème	12, 13/08	18, 19/08	fort
Forté	12ème	12, 13/08	18, 19/08	fort
Froidmont	Pbe technique			
Inval	12ème	12, 13, 14, 16, 17/08	19 au 24/08	fort
Marcelcave	13ème	14/08	20/08	fort
St Just	10ème	aucune	aucune	faible
Vauvillers	14ème	14/08	20/8	fort
Verdilly	10ème	aucune	aucune	nul
Vic sur Aisne	9ème	aucune	aucune	faible
Villeroy	Pbe technique			
Villiers le Sec	11ème	aucune	aucune	nul
Villiers Bocage	13ème	11, 12/08	19/08	fort

BnF
S&T

752

Ministère
de l'Agriculture
Service Régional de la
Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
BP 69
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56
E-mail : srpv.draf-
picardie@agriculture.gouv.fr
Notre site : www.srpv-
picardie.com

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant :
Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.A.P n°1823AD
ISSN n°07576609

Tarif Courrier 55 €
Tarif Fax 55 €
Tarif E-mail 55 €